

TC

対象

卵巣癌・子宮体癌

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日 (d1,d8等)
1	パクリタキセル	175mg/m ²	div	3hr	day1
2	カルボプラチン	AUC5	div	1hr	day1
3					

1コース期間	21days
総コース数	6コース
コース間での休薬の規定	なし
投与量の増量規定	なし
減量規定・中止基準	7日間持続するGrade 4の好中球減少 (500/mm ³ 未満) 発熱性好中球減少 (腋窩温38.0℃以上、口腔内38.5℃以上の発熱を伴うGrade 3-4の好中球減少) Grade 4以上の血小板減少 (25,000/mm ³ 未満)
コースによる変化	なし
投与間隔の短縮規定	なし
2コース目以降の投与開始基準	Neutro ≥ 1000 / μL PLT ≥ 10万 / μL
注意すべき副作用	

TC

1コース期間 21日
 所要時間 5時間

Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与速度	投与時間	d1
1	生食 100mL アロキシ 0.75mg ファモチジン 20mg デカドロン 16.5mg ★イメンドカプセル125mg 内服 ★レスタミン錠 50mg 内服		div	400mL/hr	15min	○
2	生食 100mL 1B		div	200ml/hr	30min	○
3	生食 500mL 1B パクリタキセル 【 】mg	175 mg/m ²	div	166mL/hr	180min	○
4	5%ブドウ糖液 250mL 1B カルボプラチン 【 】mg	AUC5	div	250mL/hr	60min	○
5	生食 50mL 1B		div	200ml/hr	15min	○

コメント

- ・点滴開始時、レスタミン錠(50mg)内服
- ・day1 イメンドカプセル (125mg) 1cap 分1 点滴開始前 day2.3 イメンドカプセル(80mg)1cap 分1朝食後
- ・day2～ デカドロン4mg 分1(朝食後) 3日間

Reference: