

# Pmab

対象 結腸・直腸癌

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1hr	d1

1コース期間	2週間								
総コース数	なし								
投与開始基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・好中球<math>\geq</math>1500</li> <li>・PLT<math>\geq</math>7.5万</li> <li>・HGB<math>\geq</math>8.0</li> <li>・T-Bil<math>\leq</math>施設基準上限(1.2)×1.5</li> <li>・AST、ALT<math>\leq</math>施設基準上限(AST:33、ALT:男性42、女性27)×3(肝転移:×5)</li> <li>・クレアチニン<math>\leq</math>施設基準上限(1.06)×1.5</li> </ul>								
減量規定・中止基準	<p>Grade4の皮膚障害を認めた場合は、Pmabを中止。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">減量レベル</th> <th style="width: 70%;">Pmab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回投与量</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(単位mg/kg)</p>	減量レベル	Pmab	初回投与量	6	-1	4.8	-2	3.6
減量レベル	Pmab								
初回投与量	6								
-1	4.8								
-2	3.6								
2コース目以降の投与開始基準	投与開始基準に準じる								
コース間での休薬の規定	なし								
投与量の増量規定	なし								
注意すべき副作用	インフュージョンリアクション、皮膚障害、低Mg血症など								

# Pmab

1コース期間 : 14日  
 投与所要時間 : 1時間30分

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	day1
主管	1	生食50mL ★ルートキープ用		div	15min	○
	2	生食100mL ベクティビックス 【     】mg	6 mg/kg	div	1hr	○
	3	生食50mL		div	15min	○

## コメント

・血清Mg値低下時、硫酸Mg補正液を投与。1A投与時は30分、2A投与時は1時間で投与する。  
 \*初回投与時、保湿剤へパリン類似物質油性クリーム処方。  
 症状に応じてステロイド外用薬(顔:ロコイドクリーム<sup>®</sup>、体:リンデロンV軟膏<sup>®</sup>)、ミノサイクリン200mg分2(肝機能低下患者にはクラリスロマイシン200mg分2)の処方を検討。

## Reference:

Van Custem E., et al.:Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best supportive care alone in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2007; 25: 1658-1665.  
 Rafael G, Amado., et al.:Wild-Type KRAS Is Required for Panitumumab Efficacy in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol 2008; 26: 1626-1634.

## Reference: