

# mFOLFOX6

対象

結腸・直腸癌

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	d 1
2	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	d 1
3	5FU	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	15min	d 1
4	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46hr	d 1- d 3

1コース期間	2週間																
総コース数	PDになるまで																
投与開始基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>・好中球 ≥ 1500</li> <li>・PLT ≥ 10万</li> <li>・HGB ≥ 9.0</li> <li>・T-Bil ≤ 施設基準上限(1.2) × 1.5</li> <li>・AST、ALT ≤ 100(肝転移: ≤ 200)</li> <li>・クレアチニン ≤ 施設基準上限(1.06) × 1.5</li> </ul>																
減量規定・中止基準	<p>Grade3の白血球減少、好中球減少、血小板減少、非血液毒性 5-FU (bolus)、L-OHPは、副作用状況により投与しない場合がある。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">減量レベル</th> <th style="width: 15%;">L-OHP</th> <th style="width: 15%;">5FU(bolus)</th> <th style="width: 15%;">5FU(持続静注)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回投与量</td> <td>85</td> <td>400</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>65</td> <td>300</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>50</td> <td>200</td> <td>1600</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(単位mg/m<sup>2</sup>)</p>	減量レベル	L-OHP	5FU(bolus)	5FU(持続静注)	初回投与量	85	400	2400	-1	65	300	2000	-2	50	200	1600
減量レベル	L-OHP	5FU(bolus)	5FU(持続静注)														
初回投与量	85	400	2400														
-1	65	300	2000														
-2	50	200	1600														
2コース目以降の投与開始基準	投与開始基準に準じる																
コース間での休薬の規定	なし																
投与量の増量規定	なし																
注意すべき副作用	骨髄抑制、末梢神経障害、下痢、吐気、口内炎、インフュージョンリアクション																

# mFOLFOX6

1コース期間 : 14日  
 投与所要時間 : 2時間45分

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	day1
主管	1	カイトリルバック 100mL デカドロン 4.95mg ★イメンドカプセル125mg 内服		div	30min	○
	2	生食50mL		div	全開	○
	3	5%ブドウ糖液 250mL オキサリプラチン 【        】mg ★Rp4を同時投与	85 mg/m <sup>2</sup>	div	2hr	○
側管	4	5%ブドウ糖液 250mL アイソボリン 【        】mg ★Rp 3の側管から同時投与	200 mg/m <sup>2</sup>	div	2hr	○
主管	5	生食 50mL 5FU 【        】mg	400 mg/m <sup>2</sup>	div	15min	○
	6	生食 【230mL-5FU】mL 5FU 【        】mg ★インフューザーポンプを用いて	2400 mg/m <sup>2</sup>	div	46hr	○

**コメント**

- ・嘔気コントロール不良時は、カイトリル⇒アロキシへの変更を考慮。
- ・イメンドカプセル: day1⇒125mg 1cap内服、day2・3⇒80mg 1cp 内服

Reference: