

CPT-11 + CDDP

対象

胃癌

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	イリノテカン	70mg/m ²	div	1.5hr	d 1,15
2	シスプラチン	80mg/m ²	div	2hr	d 1

1コース期間	4週間
総コース数	なし
コース間での休薬の規定	なし
投与量の増量規定	なし
減量規定・中止基準	好中球数<1000/mm ³ 血小板<10万/mm ³ Hb<8.0g/dL AST>100IU/L, ALT>100IU/L 総ビリルビン>1.5mg/dL 血清クレアチニン>施設上限 またはクレアチンクリアランス<50ml/min で考慮 有害事象により減量が必要な場合、80% doseに減量
コースによる変化	特になし
投与間隔の短縮規定	なし
2コース目以降の投与開始基準	好中球数≥2000/mm ³ 血小板≥10万/mm ³ Hb≥8.0g/dL AST≤100IU/L, ALT≤100IU/L 総ビリルビン≤1.5mg/dL 血清クレアチニン≤施設上限 またはクレアチンクリアランス≥50ml/min で考慮
注意すべき副作用	好中球減少、下痢、悪心・嘔吐

CPT-11 + CDDP

1コース期間 28日

投与所用時間 day15⇒2時間

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与速度	投与時間	d 1	d 2	d15
主管	1	ソリューゲンG 500mL 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 8mL		div	120min	9:45-11:45	○		
	2	生食 100mL アロキシ(0.75mg) 1V デカドロン 9.9mg ★イメンド125mg 内服		div	15min	11:45-12:00	○		
	3	生食 500mL カンプト【 】mg	70 mg/m ²	div	90min	12:00-13:30	○		
	4	20% マンニトール 300mL		div	60min	13:30-14:30	○		
	5	生食 【500-CDDP量】mL ランダ 【 】mg total 500mL	80 mg/m ²	div	120min	14:30-16:30	○		
	6	ソリューゲンG 500mL		div	120min	16:30-18:30	○		
	7	ソルデム3A 500mL		div	120min	18:30-20:30	○		
	8	ソルデム3A 500mL		div	180min	20:30-23:30	○		
主管	1	ソリューゲンG 500mL		div	180min	10:00-13:00		○	
	2	ソルデム3A 500mL		div	180min	13:00-16:00		○	
主管	1	カイトリルバッグ 100mL デカドロン 9.9mg		div	15min	11:45-12:00			○
	2	生食 500mL カンプト 【 】mg	70 mg/m ²	div	90min	12:00-13:30			○
	3	生食 50mL		div	15min	13:30-13:45			○

コメント

炭酸水素ナトリウム末 1.8g 分3食後 3日間 day1, 15:朝から服用

- * イメンドカプセル⇒day1: 125mg、day2-3: 80mg (内服)
- * デカドロン錠: day2~4, 16~17: DEX 8mg 分1朝食後 (内服)
- * DMなど: day15のカイトリルをアロキシに変更し、day16以降のDEX内服省略可

Reference: