

5FU/CDDP＋Cmab

対象

頭頸部癌

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	div	2hr(初回) 1hr(2回目以降)	day1,8,15
2	5FU	1000mg/body/day	iv シリンジポンプ	24hr×4days	day1～4
3	シスプラチン	80mg/m ²	div	2hr	day1

1コース期間	21日
総コース数	6回まで
コース間での休薬の規定	以下を1つでも満たし主治医が休薬必要と判断した場合。①骨髓機能：白血球＜2,000/mm ³ 、好中球数＜1,000/mm ³ 、血小板＜75,000/mm ³ 、②その他の薬物有害反応：T-bil＞1.5、AST/ALT基準値上限の1.5倍 ③PSが3以下に低下
投与量の増量規定	増量はなし
減量規定・中止基準	①可逆的なGrade3以上の腎毒性：次回以降CDDP80%に減量 ②Grade3以上の粘膜障害：次回以降CDDP、5-FUを75%に減量 ③Grade3以上の血液毒性：Grade2以上に回復するまでは中止 ④非可逆的腎毒性では中止 ⑤間質性肺炎の新規出現、もしくは増悪がみられる場合 ⑥中等度以上のinfusion reactionを認めた場合 ⑦心毒性が認められる場合 ⑧血栓塞栓症を認めた場合 ⑨治療効果がPDIになる
コースによる変化	なし
投与間隔の短縮規定	なし
2コース目以降の投与開始基準	中止基準にあてはまらない場合。
注意すべき副作用	infusion reaction、皮膚症状、間質性肺炎、心毒性、低マグネシウム血症、眼障害、血栓塞栓症、浮腫、心タンポナーデ、肺水腫、下痢や吐き気、嘔吐などの消化器症状、脱毛、発疹、骨髓抑制、腎毒性など

5FU/CDDP+Cmab(1回目)

1コース期間

: 21日

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間		day1	day2	day3	day4	day8	day15
主管①	1	ソリューゲンG 500mL		div	2hr	5:30～7:30	○					
	2	ソリューゲンG 500mL 硫酸Mg補正液 20mL		div	2hr	7:30～9:30	○					
	3	生食 100mL デカドロン 9.9mg アロキシ(0.75) 1V ボラミン(5) 1A ★調製後3時間以内に投与 ★イメンドカプセル内服		div	30min	9:30～10:00	○					
	4	生食 50mL		div	全開	10:00	○					
主管②	5	5FU 1000mg 生食 28mL total 48mL ★シリンジポンプで	1000 mg/body	iv	24hr	10:00～翌10:00	○	○	○	○		
主管①	6	生食 500mL アービタックス【 】mg	400 mg/m ²	div	2hr	10:00～12:00	○					
	7	生食 250mL		div	1hr	12:00～13:00	○					
	8	生食500mL(ーランダ容量) ランダ【 】mg total 500mL	80 mg/m ²	div	2hr	13:00～15:00	○					
	9	ソリューゲンG 500mL ラシックス(20) 1A		div	2hr	15:00～17:00	○					
	10	ソルデム3A 500mL		div	2hr	17:00～19:00	○					
	11	ソルデム3A 500mL		div	3hr	19:00～22:00	○					
主管①	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg		div	15min	8:45～9:00		○				
	1'	生食 100mL デカドロン 9.9mg		div	15min	8:45～9:00			○	○		
	2	ソリューゲンG 500mL		div	2hr	9:00～11:00		○				
	3	ソルデム3A 500mL		div	2hr	11:00～13:00		○				
主管①	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg ボラミン(5) 1A		div	15min						○	○
	2	生食 100mL 硫酸Mg(20mEq) 1A(2A)		div	30min (60min)						○	○
	3	生食250mL アービタックス【 】mg	2回目以降250mg/m ²	div	1hr						○	○
	4	生食 50mL		div	15min						○	○

コメント

Reference

5FU/CDDP+Cmab(2回目以降)

1コース期間

: 21日

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間		day1	day2	day3	day4	day8	day15
主管①	1	ソリューゲンG 500mL		div	2hr	5:30～7:30	○					
	2	ソリューゲンG 500mL 硫酸Mg補正液 20mL		div	2hr	7:30～9:30	○					
	3	生食 100mL デカドロン 9.9mg アロキシ(0.75) 1V ボラミン(5) 1A ★調製後3時間以内に投与 ★イメンドカプセル内服		div	30min	9:30～10:00	○					
	4	生食 50mL		div	全開	10:00	○					
主管②	5	5FU 1000mg 生食 28mL total 48mL ★シリンジポンプで	1000 mg/body	iv	24hr	10:00～翌10:00	○	○	○	○		
主管①	6	生食 250mL アービタックス【 】mg	250 mg/m ²	div	1hr	10:00～11:00	○					
	7	生食 50mL		div	15min	11:00～11:15	○					
	8	生食500mL(ーランダ容量) ランダ【 】mg total 500mL	80 mg/m ²	div	2hr	11:15～13:15	○					
	9	ソリューゲンG 500mL ラシックス(20) 1A		div	2hr	13:15～15:15	○					
	10	ソルデム3A 500mL		div	2hr	15:15～17:15	○					
	11	ソルデム3A 500mL		div	3hr	17:15～20:15	○					
主管①	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg		div	15min	8:45～9:00		○				
	1'	生食 100mL デカドロン 9.9mg		div	15min	8:45～9:00			○	○		
	2	ソリューゲンG 500mL		div	2hr	9:00～11:00		○				
	3	ソルデム3A 500mL		div	2hr	11:00～13:00		○				
主管①	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg ボラミン(5) 1A		div	15min						○	○
	2	生食 100mL 硫酸Mg(20mEq) 1A(2A)		div	30min (60min)						○	○
	3	生食250mL アービタックス【 】mg	2回目以降250mg/m ²	div	1hr						○	○
	4	生食 50mL		div	15min						○	○

コメント

Reference