

5FU/CDDP(700/70)(食道癌CRT)

対象

食道がん

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	シスプラチン	70mg/m ²	div	2hr	day1
2	5FU	700mg/m ²	div	24hr	day1-4

1コース期間	4週間												
総コース数	なし												
投与開始基準	<ul style="list-style-type: none"> ・好中球 ≥ 1500 ・PLT ≥ 10万 ・HGB ≥ 10.0 ・T-Bil ≤ 1.5 ・AST、ALT ≤ 施設基準上限(1.06) × 2 ・S-Cre ≤ 1.2 かつ Ccr ≥ 60 												
減量規定・中止基準	<p>・WBC ≥ 2000、好中球 ≥ 1000を満たさなかった日単位で投与を延期する。 2000 ≤ WBC < 3000の場合は、放射線療法を完遂できることを第一考え、5FU,CDDPともに2段階減量して投与する。</p> <p>・G4の好中球減少を認めた場合、投与中止し、G3以下に改善したら再開する。</p> <p>・G4の白血球減少、好中球減少、G3以上のFNを認めた場合、PLT < 5万を認めた場合、次コースから5FU,CDDPともに1段階減量して投与する。</p> <p>・AST・ALT > 200、ビリルビン > 3.0を目安として、肝機能障害を認めた場合、次コースから5FU,CDDPともに1段階減量して投与する。</p> <p>・Ccr < 60でCDDPの減量を考慮</p> <p>減量方法</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">減量レベル</th> <th style="width: 15%;">CDDP</th> <th style="width: 15%;">5FU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回</td> <td>70</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>60</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>40</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	減量レベル	CDDP	5FU	初回	70	700	-1	60	600	-2	40	400
減量レベル	CDDP	5FU											
初回	70	700											
-1	60	600											
-2	40	400											
2コース目以降の投与開始基準	投与開始基準に準じる												
コース間での休薬の規定	なし												
投与量の増量規定	なし												
注意すべき副作用	悪心・嘔吐、骨髄抑制												

5FU/CDDP(700/70)(食道癌CRT)

1コース期間 28日

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与速度	投与時間	day1	day2	day3	day4
主管	1	ソリューゲンG 500mL		div	120min	7:30-9:30	○			
	2	ソリューゲンG 500mL 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 8mL		div	120min	9:30-11:30	○			
	3	生食 100mL アロキシ(0.75mg) 1V デカドロン 9.9mg ★イメンドカプセル125mg 内服		div	30min	11:30-12:00	○			
	4	生食 50mL		div	全開	12:00	○			
	5	20%マンニトール 300mL		div	60min	12:00-13:00	○			
	6	生食 【500-CDDP量】mL ランダ 【 】mg total 500mL	70 mg/m ²	div	120min	13:00-15:00	○			
	7	ソリューゲンG 500mL		div	120min	15:00-17:00	○			
	8	ソルデム3A 500mL		div	120min	17:00-19:00	○			
	9	ソルデム3A 500mL		div	180min	19:00-22:00	○			
側管	1	生食 500mL 5FU 【 】mg ★ランダ投与終了を確認後、投与開始	700 mg/m ²	div	24hr	16:00-16:00	○	○	○	○
主管	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg		div	15min	9:45-10:00		○		
	2	ソリューゲンG 500mL		div	180min	10:00-13:00		○		
	3	ソルデム3A 500mL		div	180min	13:00-16:00		○		
主管	1	生食 100mL デカドロン 9.9mg		div	15min	10:00-10:15			○	○

コメント

・イメンドカプセル: day1⇒125mg 1cap内服、day2・3⇒80mg 1cp 内服

Reference: