

5FU/CDDP(800/80)

対象 食道がん

投与順	抗癌剤名	投与量	手技	投与時間・速度	投与日(d1,d8等)
1	シスプラチン	80mg/m ²	div	2hr	day1
2	5FU	800mg/m ²	div	24hr	day1-5

1コース期間	4週間												
総コース数	なし												
投与開始基準	<ul style="list-style-type: none"> ・好中球 ≥ 1500 ・PLT ≥ 10万 ・HGB ≥ 10.0 ・T-Bil ≤ 1.5 ・AST、ALT ≤ 施設基準上限 (1.06) × 2 ・S-Cre ≤ 1.2 かつ Ccr ≥ 60 												
減量規定・中止基準	<ul style="list-style-type: none"> ・WBC ≥ 2000、好中球 ≥ 1000を満たさなかった日単位で投与を延期する。 ・G4の好中球減少を認めた場合、投与中止し、G3以下に改善したら再開する。 ・G4の白血球減少、好中球減少、G3以上のFNを認めた場合、PLT < 5万を認めた場合、次コースから5FU,CDDPともに1段階減量して投与する。 ・AST・ALT > 200、ビリルビン > 3.0を目安として、肝機能障害を認めた場合、次コースから5FU,CDDPともに1段階減量して投与する。 ・Ccr < 60でCDDPの減量を考慮 <p>減量方法</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>減量レベル</th> <th>CDDP</th> <th>5FU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回</td> <td>80</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>-1</td> <td>60</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>40</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	減量レベル	CDDP	5FU	初回	80	800	-1	60	600	-2	40	400
減量レベル	CDDP	5FU											
初回	80	800											
-1	60	600											
-2	40	400											
2コース目以降の投与開始基準	投与開始基準に準じる												
コース間での休薬の規定	なし												
投与量の増量規定	なし												
注意すべき副作用	悪心・嘔吐、骨髄抑制												

5FU/CDDP(800/80)

1コース期間 28日

ルート	Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与速度	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5
主管	1	ソリューゲンG 500mL		div	120min	7:30-9:30	○				
	2	ソリューゲンG 500mL 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 8mL		div	120min	9:30-11:30	○				
	3	生食 100mL アロキシ(0.75mg) 1V デカドロン 9.9mg ★イメンドカプセル125mg 内服		div	30min	11:30-12:00	○				
	4	生食 50mL		div	全開	12:00	○				
	5	20%マンニトール 300mL		div	60min	12:00-13:00	○				
	6	生食 【500-ランダ容量】mL ランダ 【 】mg Total 500mL	80 mg/m ²	div	120min	13:00-15:00	○				
	7	ソリューゲンG 500mL		div	120min	15:00-17:00	○				
	8	ソルデム3A 500mL		div	120min	17:00-19:00	○				
	9	ソルデム3A 500mL		div	180min	19:00-22:00	○				
側管	1'	生食 500mL 5FU 【 】mg ★ランダ投与開始終了を確認後、投与開始	800 mg/m ²	div	24hr	16:00-16:00	○	○	○	○	○
主管	1	生食 100mL デカドロン 6.6mg		div	15min	9:45-10:00		○			
	2	ソリューゲンG 500mL		div	180min	10:00-13:00		○			
	3	ソルデム3A 500mL		div	180min	13:00-16:00		○			
主管	1	生食 100mL デカドロン 9.9mg		div	15min	10:00-10:15			○	○	○

コメント

・イメンドカプセル: day1⇒125mg 1cap内服、day2・3⇒80mg 1cp 内服

Reference: